환자 안내자료

병원:

치료과정의 진정제 투여

응급실에서 진료의 일부로써 다음과 같은 치료중에 진정제가 투여될 수 있습니다:

_____

_____

진정제의 효과가 완전히 사라질 때까지 투여후 12시간 동안 휴식을 취할 것을 권합니다.

투여받은 약의 진정 효과 때문에 섬세한 기능 및 판단력에 장애가 올 수 있으므로 **차후 24 시간 동안** 다음과 같은 활동을 **하지 마십시오**:

- 운전
- 기계 작동
- 위험성이 있는 전기 도구 혹은 전동 공구 사용
- 높은 곳에서의 작업 (예: 사다리 오르기)
- 음주
- 기분 전환 약제 복용
- 수영 혹은 스포츠 활동 참여

반드시 명심할 사항

- 평소대로 먹던 약을 계속해서 복용
- 24시간 후 혹은 권장된 대로 정상적인 활동으로 돌아갈 수 있어야 함.

후속 예약 날짜:

_____

_____

통증 경감이 더 필요할 때 복용해야 될 약:

_____

_____

차후 24시간 동안에 어떤 우려나 문제가 생겼을 때 혹은 후속 예약을 하기 전에 반드시 병원의 응급실에 연락을 해야합니다.

아래 의료진이 위의 통지 사항을 설명했습니다:

이름: _____ 직함: _____

사인: _____ 날짜: _____

2013년 4월에 Liverpool 응급실 진정제 시술 성인 안내 (Procedural Sedation Discharge Adult Advice) 양식에 기초하여 ECI에서 만듦. Dr Tammy Wu에게 감사를 표하며 - 웹사이트 www.ecinsw.com.au를 통해 온라인으로도 볼 수 있음.

Emergency Care Institute NEW SOUTH WALES

Published Oct 2015. Next Review 2025. © State of NSW (Agency for Clinical Innovation)

면책 조항: 이 의료 안내자료는 일반적인 교육 목적만을 위해 만들어졌습니다. 이 안내자료가 당신에게 해당되는 지를 확인하기 위해서는 주치의나 다른 의료진들에게 항상 상담을 받아야 합니다.